

予防接種スケジュール

大切な子どもをワクチンで防げる病気から守るためには、接種できる時期がきたら、できるだけおすすめの接種時期に、予防接種を受けることが重要です。

令和6年4月1日改正

ワクチン名			接種済み ☑	0歳	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳
定期接種	ロタウイルス	経口生ワクチン	どちらかを選択	ロタリックス 1価 □□		← ① →	②																					
		経口生ワクチン		ロタテック 5価 □□□		← ① →	②	③																				
	小児用肺炎球菌	不活化ワクチン	□□□□		①	②	③											④										
	B型肝炎	不活化ワクチン	□□□		①	②					③																	
	五種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ)	不活化ワクチン	□□□□		①	②	③											④										
	BCG	注射生ワクチン	□									①																
	MR (麻しん風しん混合)	注射生ワクチン	□□															①					②					
	水痘 (水ぼうそう)	注射生ワクチン	□□															①	②									
任意接種	日本脳炎	不活化ワクチン	□□□□																① ② ③						④			
	二種混合 (ジフテリア・破傷風)	不活化ワクチン	□																								①	
	おたふくかぜ	注射生ワクチン	□															①		②								

砂川市立病院は、ロタリックス1価での接種となります。ただし、転入などで1～2回目をロタテック5価で接種してきた場合はロタテック5価にも対応します。明円医院は、ロタリックス1価のみ対応です。

BCGは砂川市立病院での接種です。

お誕生日を過ぎたらできるだけ早く接種しましょう。2歳を過ぎると有料になります。

接種期間は、小学校就学前の1年間(4月1日～3月31日)です。対象となる年の4月に案内を郵送します。

1～3回目までの予防接種は、3歳児健診でお渡しします。4回目は10歳になる年に郵送します。

小学6年生で案内を郵送します。

○必ず予約が必要です。医療機関に希望する予防接種を予約の上、母子手帳と予防票を持参して受診下さい。

○令和6年4月1日より、五種混合と小児肺炎球菌(15価)が定期接種となりました。令和6年2月生まれ以降の方が対象です。

○異なるワクチンの接種間隔について
注射生ワクチンと注射生ワクチンは27日以上あけて接種します。それ以外は制限が撤廃されましたので、翌日に異なるワクチンを受けることが可能です。

○おたふくかぜは、任意接種ですので、申し込みや料金などは各医療機関へご相談ください。

○予防接種の受け方でわからないことがあればご連絡ください。

- 濃** 無料で受けられる期間(定期接種の対象年齢)
- 薄** 任意接種で受けられますが、有料になります
- ← ① → おすすめの接種時期(数字は接種回数)
- ① 同時に接種することが可能

問い合わせ先：砂川市ふれあいセンター 電話 52-2000

【予防接種実施医療機関】

* 予防接種は完全予約制となっていますので事前に電話で予約して受診して下さい。

医療機関名	住所	電話番号	接種できる曜日・時間	同時接種	BCG	ロタリックス 1価	ロタテック 5価
砂川市立病院 (小児科)	砂川市西4条北3丁目1-1	54-2131 (医事課業務係)	月～水、金 13:15～14:00	○	○	○	転入者で1～2 回目を5価で接 種した方のみ
明 円 医 院	砂川市空知太東1条3丁目1-14	53-2100	月・火・木・金 8:30～16:00 水・土 8:30～11:00	○ (一部)	×	○	×



【予防接種の種類・対象年齢・接種回数・間隔】

予防接種の種類		対象年齢	接種回数	標準的な接種期間等
ロタウイルス ※どちらかを選択	ロタリックス(1価)	生後6週～24週まで	2回	初回は、生後2か月から生後14週6日までに接種し、2回目は27日以上の間隔をおいて生後24週0日までに接種
	ロタテック(5価)	生後6週～32週まで	3回	初回は、生後2か月から生後14週6日までに接種し、2回目・3回目はそれぞれ27日以上の間隔をおいて生後32週0日までに接種
小児肺炎球菌		2か月～5歳未満	4回	①初回接種は、生後2か月から7か月までに、27日以上の間隔を置いて3回接種 ②追加接種は、3回目終了後60日以上の間隔を置いて、生後12か月から15か月の間に1回接種する
B型肝炎		2か月～1歳未満	3回	①1回目は、生後2か月から ②2回目は、1回目から27日以上の間隔をおいて接種 ③3回目は、1回目終了後139日以上(約5か月)の間隔をおいて生後9か月に至るまでに接種
五種混合 (ジフテリア・百日ぜき・破傷風・ポリオ・ヒブ)		2か月～7歳6か月未満	4回	①1期初回→生後2か月から7か月までに、20日以上の間隔をおいて3回接種 ②1期追加→3回目終了後6か月から18か月の間隔をおいて1回接種
BCG		1歳未満	1回	生後5か月から8か月までに1回接種
麻しん風しん (MR)	1期	1歳～2歳未満	1回	1歳を過ぎたら早めに1回接種
	2期	5歳～7歳未満 (小学校就学前の1年間)	1回	就学前の1年間で1回接種
水痘(水ぼうそう)		1歳～3歳未満	2回	1回目は生後12か月から15か月までに接種し、3か月以上(標準的には6か月～12か月)の間隔をおいて2回目を接種
日本脳炎	1期	6か月～7歳6か月未満	3回	①1期初回→3歳～4歳までに6日以上の間隔をおいて2回接種 ②1期追加→4歳～5歳までに2回目終了後から6か月以上の間隔をおいて1回接種
	2期	9歳～13歳未満	1回	3回目(1期追加)から5年の間隔をおいて1回接種
二種混合(ジフテリア・破傷風)		11歳～13歳未満	1回	小学6年生で1回接種

※ロタワクチンは、月齢が進むと腸重積症にかかりやすくなるため初回接種は生後14週6日までに受けましょう。